



St. Antoni M<sup>o</sup> Claret, 111-113  
08025 Barcelona  
Tel. 93 456 18 85  
Fax 93 433 43 47  
exode@exode.es  
www.exode.es

## Recomendación Vacunas

Esta información es de carácter orientativo y no vinculante a ninguna responsabilidad de Exode viatges. Las indicaciones de vacunas y demás medidas preventivas específicas a cada destino deben ser indicadas por personal facultativo médico cualificado. Cada viajero debe informarse de que vacunas necesita. Esta información ha sido extraída íntegramente de la página web [www.msc.es](http://www.msc.es) (ministerio, Sanidad y consumo). Aconsejamos revisar y actualizar la información desde la misma página web.

## AFRICA AUSTRAL

### VACUNAS EXIGIDAS

#### NAMIBIA

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Se consideran zonas con riesgo de transmisión los países por partes de países situados en zonas endémicas de África y América del Sur. No exige certificado de los pasajeros de líneas aéreas regulares que hayan iniciado su viaje fuera de países con riesgo de transmisión aunque hayan pasado en tránsito por tales países si no han salido del aeropuerto de escala o la ciudad adyacente durante el mismo. Todos los países que hayan comenzado su viaje en un país con riesgo de transmisión o hayan pasado en tránsito por dichos países y no viajen en un avión de línea regular deben presentar un certificado. No se exige certificado a los niños menores de un año, pero podrán ser sometidos a vigilancia.

#### BOSTWANA

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de un año procedente o que hayan pasado por países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. España no se encuentra en estas zonas.

#### ZIMBAWE

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

#### ZAMBIA

Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales.

### VACUNAS RECOMENDADAS

#### PARA NAMIBIA – BOSTWANA – ZIMBABWE - ZAMBIA

Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.

### PALUDISMO

#### NAMIBIA

Existe riesgo de paludismo desde noviembre a junio predominantemente por *P. falciparum*- en las siguientes regiones: Hosanna, Oshoto, Omusati, Omaheke, Ohangwena y Otjozondjupa. Existe riesgo durante todo el año a lo largo del río Kunene y en las regiones de Kavango y Caprivi. Se han notificado resistencia a la cloroquina y la sulfadoxina – pirimetamina.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo IV



St. Antoni M<sup>o</sup> Claret, 111-113  
08025 Barcelona  
Tel. 93 456 18 85  
Fax 93 433 43 47  
exode@exode.es  
www.exode.es

### **BOSTWANA**

Existe riesgo de paludismo predominantemente por *P. falciparum*- desde noviembre a finales de mayo/junio en las zonas septentrionales del país: los distritos/ subdistritos de Boleti, Chobe, Ngamiland, Okavango, Tutume. Se ha notificado resistencia del *P. falciparum* a la cloroquina.

Prevención recomendada en la zonas de riesgo: Tipo IV

### **ZIMBAWE**

Existe riesgo de paludismo predominantemente por *P. falciparum*- desde noviembre a finales de junio en las zonas por debajo de 1200 metros de altitud y todo el año en el valle del Zambeze. En Harare y Bulawayo, el riesgo es insignificante. Se ha notificado resistencia a la cloroquina y a la sulfadoxina-pirimetamina.

Prevención recomendada en la zonas de riesgo: Tipo IV

### **ZAMBIA**

Existe riesgo de paludismo predominantemente por *P. falciparum*- durante todo el año y en todo el país. Se ha notificado resistencia a la cloroquina y a la sulfadoxina-pirimetamina.

Prevención recomendada. Tipo IV