



St. Antoni M<sup>o</sup> Claret, 111-113  
08025 Barcelona  
Tel. 93 456 18 85  
Fax 93 433 43 47  
exode@exode.es  
www.exode.es

## Recomendación Vacunas

Esta información es de carácter orientativo y no vinculante a ninguna responsabilidad de Exode viatges. Las indicaciones de vacunas y demás medidas preventivas específicas a cada destino deben ser indicadas por personal facultativo médico cualificado. Cada viajero debe informarse de que vacunas necesita. Esta información ha sido extraída íntegramente de la página web [www.msc.es](http://www.msc.es) ( ministerio, Sanidad y consumo) . Aconsejamos revisar y actualizar la información desde la misma página web.

## BRASIL

### VACUNAS EXIGIDAS

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses procedentes de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, excepto si presentan una exención la que se indica que la vacunación está contraindicada por razones médicas. Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: se recomienda la vacuna a los viajeros que visitan las siguientes áreas de Brasil con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla: a) la totalidad del territorio de los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal y Minas Gerais; b) zonas específicas de los estados de Espírito Santo, Piauí, Bahía, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. El mapa de la siguiente página web muestra las áreas con riesgo de transmisión de fiebre amarilla:

[http://srvportal3.saude.gov/portal/arquivos/jpg/mapa\\_fa.jp](http://srvportal3.saude.gov/portal/arquivos/jpg/mapa_fa.jp).

Las áreas costeras de los estados de Piauí, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía, Espírito Santo, Sao Paulo, Parana, Santa Catalina y Rio Grande del Sur NO son áreas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

### VACUNAS RECOMENDADAS

Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.

### PALUDISMO

El riesgo de paludismo - P. vivax (75%), P. falciparum (25%)- está presente en la mayor parte de las zonas más boscosas situadas por debajo de los 900 metros de altitud en 9 estados de la región de la "Amazonia Legal" (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhao (parte oeste), Mato Grosso (parte norte), Pará (excepto la ciudad de Belém), Rondônia, Roraima y Tocantins –parte occidental-). La intensidad de la transmisión varía de municipio a municipio, pero es más alta en zonas de jungla mineras, madereras, y asentamientos agrícolas de menos de 5 años de antigüedad que en las zonas urbanas, incluidas grandes ciudades como Pôrto Velho, Boa Vista, Macapá, Manaus, Santarém, Río Branco y Maraba, donde se produce transmisión en la periferia de dichas ciudades. En los estados situados fuera de la "Amazonia Legal", el riesgo de transmisión del paludismo no existe o es insignificante. Se ha notificado P. falciparum resistente a múltiples medicamentos.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo IV