



St. Antoni M^o Claret, 111-113
08025 Barcelona
Tel. 93 456 18 85
Fax 93 433 43 47
exode@exode.es
www.exode.es

Recomendación Vacunas

Esta información es de carácter orientativo y no vinculante a ninguna responsabilidad de Exode viatges. Las indicaciones de vacunas y demás medidas preventivas específicas a cada destino deben ser indicadas por personal facultativo médico cualificado. Cada viajero debe informarse de que vacunas necesita. Esta información ha sido extraída íntegramente de la página web www.msc.es (ministerio, Sanidad y consumo). Aconsejamos revisar y actualizar la información desde la misma página web.

INDIA

VACUNAS EXIGIDAS

Toda persona (con excepción de los niños menores de seis meses) que llegue por vía aérea o marítima sin disponer de un certificado de vacunación, es aislada durante un máximo de 6 días si dicha persona:

- ha salido de una zona infectada 6 días antes de su llegada.
- Ha permanecido en tránsito en dicha zona (salvo si los pasajeros y los miembros de la tripulación permanecieron durante todo el periodo de tránsito dentro del edificio del aeropuerto situado en la zona infectada y el médico del aeropuerto aprueba una exención.
- Llega en un barco que haya partido o tocado un puerto situado en una zona infectada 30 días antes de su llegada a la India, salvo si el barco ha sido desinsectado conforme al procedimiento establecido por la OMS
- Llega en un avión que, habiendo permanecido en una zona infectada, no haya sido desinsectado conforme a lo dispuesto en el reglamento de la India sobre navegación aérea (Salud Pública) de 1954 o según las disposiciones recomendadas por la OMS, se consideran infectados los países y zonas siguientes:

África: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Chad, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Uganda, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo y Zambia.

América: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

NOTA: Si un caso de fiebre amarilla es notificado en un país no incluido en la lista anterior, la India considerará dicho país como infectado por fiebre amarilla y lo añadirá a la lista.

VACUNAS RECOMENDADAS

Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.

PALUDISMO

Existe riesgo de paludismo durante todo el año en todo el país por debajo de 2.000 metros de altitud, con el 40%-50% de los casos debidos al *P. falciparum*. No existe transmisión en partes de los estados de Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira, y Sikkim. El riesgo de paludismo por falciparum y la resistencia a medicamentos son relativamente altos en los estados del noreste, en Andaman y las Islas Nicobar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Jharkhand, Karnataka (con la excepción de la ciudad de Bangalore), Madhya Pradesh, Maharashtra (con la excepción de las ciudades de Mumbai, Nagpur, Nasik y Pune), Orissa y



St. Antoni M^o Claret, 111-113
08025 Barcelona
Tel. 93 456 18 85
Fax 93 433 43 47
exode@exode.es
www.exode.es

Bengala Oeste (con la excepción de la ciudad de Calcuta). Se ha notificado *P. falciparum* resistente a la cloroquina y a la sulfadoxina-pirimetamina.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo III. En las zonas indicadas como de alto riesgo: Tipo IV.