



St. Antoni M<sup>o</sup> Claret, 111-113  
08025 Barcelona  
Tel. 93 456 18 85  
Fax 93 433 43 47  
exode@exode.es  
www.exode.es

## Recomendación Vacunas

Esta información es de carácter orientativo y no vinculante a ninguna responsabilidad de Exode viatges. Las indicaciones de vacunas y demás medidas preventivas específicas a cada destino deben ser indicadas por personal facultativo médico cualificado. Cada viajero debe informarse de que vacunas necesita. Esta información ha sido extraída íntegramente de la página web [www.msc.es](http://www.msc.es) ( ministerio, Sanidad y consumo) . Aconsejamos revisar y actualizar la información desde la misma página web.

## RUTA MAYA

### VACUNAS EXIGIDAS

#### MEXICO

Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales.

#### GUATEMALA

Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 1 año procedentes de países con zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

#### HONDURAS

Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 1 año procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla con excepción de Panamá.

### VACUNAS RECOMENDADAS

#### Para MEXICO – GUATEMALA - HONDURAS

Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.

### PALUDISMO

#### MEXICO

Existe riesgo de paludismo -casi exclusivamente por P. vivax- todo el año en algunas zonas rurales muy poco visitadas por los turistas. Existe alto riesgo de transmisión en algunas localidades y en los estados de Chiapas y Oaxaca; riesgo moderado en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Tabasco; y riesgo bajo en Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Sonora.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo II.

#### GUA TEMALA

Existe riesgo de paludismo -predominantemente por P. vivax- por debajo de 1.500 metros de altitud durante todo el año. Existe un riesgo de moderado a alto en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimala, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quiché (Ixcan) y Retalhuleu.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo II.

#### HONDURAS

El riesgo de paludismo -predominantemente por P. vivax- es alto a lo largo de todo el año en las provincias de Colón, Comayagua, Islas de la Bahía y Olancho; y moderado en la provincia de Atlántida. El riesgo más alto de P. falciparum corresponde a Colón, Comayuga, El Paraíso, Islas de la Bahía y Olancho.

Prevención recomendada: Tipo II